

# 肥満・糖尿病研究用試薬

## 甘味成分

<b>meso-Erythritol</b> (>99.0%)	25g / 100g / 500g	[E0021]
<b>Glycyrrhizin</b> (>93.0%)	1g / 25g	[G0150]
<b>Glycyrrhizin Trisodium Salt</b> (>75.0%)	25g	[G0217]
<b>Glycyrrhizin Monoammonium Salt</b> (>75.0%)	1g / 25g	[G0151]
<b>Glycyrrhizin Dipotassium Salt</b> (>75.0%)	25g	[G0270]
<b>Maltitol</b> (>93.0%)	25g / 500g	[M0601]
<b>Palatinose Hydrate</b> (>98.0%)	25g / 500g	[P1234]
<b>Rubusoside</b> (>95.0%)	25mg	[R0210]
<b>Stevioside</b> (>85.0%)	25g	[S0594]
<b>D-Sorbitol</b> (>97.0%)	25g / 500g	[S0065]
<b>Thaumatococin</b>	100mg / 1g	[T1144]
<b>D-(+)-Trehalose Anhydrous</b> (>98.0%)	5g / 25g	[T0832]
<b>D-(+)-Trehalose Dihydrate</b> (>98.0%)	25g / 500g	[T0331]
<b>Xylitol</b> (>98.0%)	25g / 500g	[X0018]
<b>Acesulfame K</b> (>98.0%)	25g / 100g / 500g	[A1490]
<b>Advantame</b> (>95.0%)	250mg	[A3471]
<b>Aspartame</b> (>98.0%)	1g / 25g	[A0997]
<b>Neotame</b> (>98.0%)	1g / 5g / 25g	[N1112]
<b>Cyclamic Acid Sodium Salt</b> (>98.0%)	25g / 500g	[C0487]
<b>Sucralose</b> (>98.0%)	5g / 25g / 100g	[S0839]
<b>Saccharin Sodium Salt Dihydrate</b> (>98.0%)	25g / 500g	[B0131]

## リパーゼ阻害剤

<b>Orlistat</b> (>97.0%)	100mg / 1g	[O0381]
<b>Cetilistat</b> (>98.0%)	1g / 5g	[C2745]

## アルドース還元酵素阻害剤

<b>Epalrestat</b> (>98.0%)	1g / 5g	[E0906]
----------------------------	---------	---------

## α-グルコシダーゼ阻害剤

<b>Acarbose</b> (>98.0%)	1g / 5g	[A2485]
<b>Miglitol</b> (>98.0%)	1g / 5g	[M2302]
<b>Moranoline</b> (>98.0%)	50mg / 250mg	[D5612]
<b>Voglibose</b> (>98.0%)	100mg	[V0119]

## 後期糖化生成物 (AGEs) 生成阻害剤

<b>Aminoguanidine Hydrochloride</b> (>98.0%)	25g / 100g / 500g	[A1129]
<b>Alagebrium Chloride</b> (>98.0%)	200mg / 1g	[A3166]
<b>Benfotiamine</b> (>98.0%)	5g / 25g	[B4711]
<b>Metformin Hydrochloride</b> (>98.0%)	25g / 100g	[M2009]

## インスリン分泌促進剤

<b>Chlorpropamide</b> (>99.0%)	25g	[C1220]
<b>Glibenclamide</b> (>98.5%)	5g / 25g	[G0382]
<b>Gliclazide</b> (>98.5%)	5g	[G0381]
<b>Glimepiride</b> (>98.0%)	1g / 5g	[G0395]
<b>Glipizide</b> (>98.0%)	1g / 5g	[G0369]
<b>Gliquidone</b> (>98.0%)	1g / 5g	[G0332]
<b>Nateglinide</b> (>98.0%)	500mg / 1g / 5g	[N0912]
<b>Repaglinide</b> (>98.0%)	200mg / 1g	[R0179]

## PPAR $\gamma$ アゴニスト

<b>Pirinixic Acid</b> (>98.0%)	1g / 5g	[C1323]
<b>Pioglitazone Hydrochloride</b> (>98.0%)	5g / 25g	[P1901]
<b>Rosiglitazone</b> (>98.0%)	200mg / 1g	[R0106]
<b>Tesaglitazar</b> (>95.0%)	25mg	[T3497]
<b>2-(Tetradecylthio)acetic Acid</b> (>98.0%)	1g / 5g	[T3787]

これらの製品はすべて“試薬”です。試験・研究用にご使用ください。

上記以外の化合物についても取り揃えています。各製品の詳細はTCIのウェブサイトでも ▶▶▶

## 東京化成工業株式会社

### 試薬製品について

■本社営業部 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階  
Tel: 03-3668-0489 Fax: 03-3668-0520 E-mail: Sales-JP@TCIchemicals.com

■大阪営業部 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-21 第2中井ビル1階  
Tel: 06-6228-1155 Fax: 06-6228-1158 E-mail: osaka-s@TCIchemicals.com

### スケールアップ、受託サービス(合成・開発・製造)について

□化成品営業部 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階  
Tel: 03-5651-5171 Fax: 03-5640-8021 E-mail: finechemicals@TCIchemicals.com

### 弊社製品取扱店

本誌掲載の化学品は試験・研究用のみ使用するものです。化学知識のある専門家以外の方のご使用はお避けください。品目や製品情報等、掲載内容の変更を予告なく行う場合があります。内容の一部または全部の無断転載・複製はご遠慮ください。