







HMG-CoA還元酵素阻害剤 スタチン

高品質なHMG-CoA還元酵素阻害剤を安価でご提供します

スタチンにはコレステロール合成で重要な役割を演じているHMG-CoA還元酵素の働きを阻害して、低比重リポタンパク (LDL) コレステロールと総コレステロール濃度を下げる効果があると報告されています。



Atorvastatin Calcium Salt Trihydrate (>98.0%)

1g / 5g [A2476]

Fluvastatin Sodium Salt (>98.0%)

1g / 5g [F0820]

Lovastatin (>98.0%)

5g / 25g [L0214]

Mevastatin (>98.0%)

100mg / 1g / 5g [M2275]

Pravastatin Sodium (>98.0%)

100mg / 500mg [P1796]

Rosuvastatin Calcium (>95.0%)

200mg [R0180]

Simvastatin (>98.0%)

100mg / 1g [S0509]

本製品は試薬であり、試験・研究用のみにご使用ください。

- 引用文献 1) Reviews of the discovery and development of statins
a) A. Endo, *Proc. Jpn. Acad., Ser. B.* **2010**, 86, 484. b) A. Endo, *J. Lipid Res.* **1992**, 33, 1569. c) J. A. Tobert, *Nat. Rev. Drug Discov.* **2003**, 2, 517.
- 2) Structural mechanism for statin inhibition of HMG-CoA reductase
a) E. S. Istvan, J. Deisenhofer, *Science* **2001**, 292, 1160. b) Y. Shitara, Y. Sugiyama, *Pharmacol. Ther.* **2006**, 112, 71. c) D. Williams, J. Feely, *Clin. Pharmacokin.* **2002**, 41, 343.
- 3) Choice of statins
Med. Lett. Drugs Ther. **1998**, 1042, 117.

上記以外の酵素阻害剤についても取り揃えています。各製品の詳細はTCIのウェブサイトでも ▶▶▶ TCI 酵素阻害剤

東京化成工業株式会社

試薬製品について

■本社営業部 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階
Tel: 03-3668-0489 Fax: 03-3668-0520 E-mail: Sales-JP@TCIchemicals.com

■大阪営業部 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-21 第2中井ビル1階
Tel: 06-6228-1155 Fax: 06-6228-1158 E-mail: osaka-s@TCIchemicals.com

スケールアップ、受託サービス (合成・開発・製造) について

□化成品営業部 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階
Tel: 03-5651-5171 Fax: 03-5640-8021 E-mail: finechemicals@TCIchemicals.com

弊社製品取扱店

本誌掲載の化学品は試験・研究用のみ使用するものです。化学知識のある専門家以外の方のご使用はお避けください。品目や製品情報等、掲載内容の変更を予告なく行う場合があります。内容の一部または全部の無断転載・複製はご遠慮ください。